Funções

Objetivos

Conceituar e testar se uma função é injetora, sobrejetora ou bijetora

Definir e representar graficamente uma função

Gerar funções compostas

Decidir se uma função tem inversa e, caso tenha, encontrá-la

Determinar o domínio, contradomínio e a imagem de uma função

Funções

O conceito de funções é um dos mais importantes na matemática e envolve muitos conteúdos visto na informática:

Algoritmos são funções; Compiladores são funções; Funções de Criptografia; Funções de Compressão; Funções de Geração de Chave de Armazenamento; etc.

Leibniz (1673) utilizou o termo **“função”** para indicar a dependência de uma quantidade em relação a uma outra.

Funções

O conceito básico de função é o seguinte: toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder **a todo** elemento do primeiro conjunto **um único** elemento do segundo, ocorre uma função.

Definição: Dados dois conjuntos A e B , e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B se, e somente se, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ de modo que x se relacione com y .

Ou seja: $f : A \rightarrow B \Leftrightarrow (\forall x \in A, \exists! y \in B / (x, y) \in f)$

Notação: (lê-se “ f é uma função de A em B ”).

Funções

Essa relação é dada através de uma lei de associação expressa na forma $y = f(x)$.

Escrevemos:

$$f: A \rightarrow B$$
$$x \rightarrow y = f(x)$$

Temos:

x é a variável *independente*

y é a variável *dependente*

y é a *imagem* de x (indica-se $y = f(x)$ e lê-se “ y é igual a f de x ”)

$f(x)$ é o *valor da função* f no ponto x ou a imagem de x por f .

Funções

Observe, por exemplo, o diagrama das relações abaixo:

A relação acima **não** é uma função, pois existe o elemento **1** no conjunto A, que não está associado a nenhum elemento do conjunto B.

A relação acima **não** é uma função, pois existe o elemento **4** no conjunto A, que está associado a mais de um elemento do conjunto B.

A relação acima **é** uma função, pois todo elemento do conjunto **A**, está associado a **somente um** elemento do conjunto **B**.

Domínio e Imagem

- ❖ **Domínio**: É o conjunto de partida, indicado por $\text{Dom}(f) = A$.
- ❖ **Contradomínio**: É o conjunto de chegada, indicado por $\text{Cd}(f) = B$.
- ❖ **Imagem**: É o conjunto de todos os valores assumidos pela função f , indicado por $\text{Im}(f) = \{y \in B / y = f(x) \text{ para algum } x \in A\}$. Note que $\text{Im}(f) \subseteq \text{Cd}(f)$.

Domínio e Imagem

Obs: quando uma função for dada por uma lei de formação sem indicar o domínio e o contradomínio, tomaremos como domínio o maior subconjunto de números reais no qual a lei de formação pode ser aplicada e para contradomínio, o conjunto dos números reais.

Exemplo:

Determinar o domínio e a imagem das funções abaixo.

a) $f(x) = \frac{1}{x}$

d) $f(x) = \sqrt{x}$

b) $g(x) = \frac{1}{x-2}$

e) $g(x) = -\sqrt{x-1}$

c) $h(x) = |x|$

Exercícios

1) Diga qual das relações abaixo representam uma função de $A = \{a, b, c\}$ em $B = \{x, y, z, w\}$

2) Dados os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$. Avalie se as relações binárias de A em B a seguir são ou não funções:

a) $R = \{(x, y) \in A \times B \mid y = (x - 1)^2 - 1\}$

b) $S = \{(x, y) \in A \times B \mid y = x + 1\}$

c) $T = \{(x, y) \in A \times B \mid y = 2\}$

Exercícios

3) Considere a função $f: A \rightarrow B$ representada pelo diagrama a seguir e determine:

- O domínio de f .
- $f(1)$, $f(-3)$, $f(3)$ e $f(2)$.
- o conjunto imagem de f .
- a lei de associação.

4) Dada a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 5x + 6$, calcule:

- $f(-4)$.
- y , quando $x = 0$.
- o valor de x cuja imagem vale 2.
- x , quando $f(x) = 0$.

Representação

Uma função pode ser representada de diferentes maneiras:

- **verbalmente**: descrevendo-a em palavras;
- **numericamente**: por meio de tabelas;
- **algebricamente**: utilizando uma fórmula matemática; ou
- **visualmente**: através de um gráfico.

Ex:

O valor a ser pago para encher o tanque de um carro depende do número de litros de gasolina utilizados. Suponha que o litro de gasolina custa R\$ 4,10 e represente esta função numericamente, algebricamente e visualmente.

Gráfico de Funções

Definição: O gráfico de uma função $f : A \rightarrow B$ é o conjunto de todos os pontos (x, y) de um plano coordenado tais que $y = f(x)$ e $x \in A$.

Simbolicamente:

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = f(x)\}$$

Exemplos:

a) $f(x) = x + 2$

b) $f(x) = x^2 - 4$

Nota: Perceba que a representação gráfica de uma função depende essencialmente de dois fatores: o tipo da função em questão e o seu respectivo domínio.

Reconhecendo Gráficos de Funções

Uma curva no plano xOy é o gráfico de uma função se, e somente se, nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez.

Exemplo: Quais dos gráficos a seguir são gráficos de funções de x e quais não são? Justifique sua resposta.

a)

Não é função

b)

É função

Gráfico de funções

Analizando graficamente o domínio e imagem de funções

Graficamente, consideramos:

Domínio $\rightarrow$ projeção ortogonal do gráfico sobre o eixo x .

Imagem $\rightarrow$ projeção ortogonal do gráfico sobre o eixo y .

Exemplos:

a)

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x < 5\}$$

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid -3 \leq y < 2\}$$

b)

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$$

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y > -2\}$$

c)

$$D = \mathbb{R}$$

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} \mid y < -1 \text{ ou } 0 < y < 3\}$$

Função Constante

É toda função do tipo

$$f(x) = k$$

que associa a qualquer número real x um número real k .

Função do Primeiro Grau

É toda função da forma

$$f(x) = ax + b, \quad a \neq 0$$

Função Quadrática

Toda função definida por

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

é chamada função do segundo grau ou quadrática.

Funções Especiais

Função Exponencial

Chamamos de função exponencial de base a a função

$$f(x) = a^x$$

que associa cada o número real x um número a^x .

Função Logarítmica

Chamamos de função logarítmica de base a a função

$$f(x) = \log_a x$$

que associa cada o número real x um número $\log_a x$.

Função Trigonométricas

$$\begin{array}{lll} f(x) = \operatorname{sen}(x), & f(x) = \cos(x), & f(x) = \operatorname{tg}(x) \\ f(x) = \operatorname{cotg}(x), & f(x) = \sec(x), & f(x) = \operatorname{cossec}(x) \end{array}$$

Composição de Funções

Definição: Sejam $g : A \rightarrow B$ e $f : B \rightarrow C$. A função composta $f \circ g$ é a função de A em C definida por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

➤ Por definição, o domínio da $f \circ g$ consiste em todo o x no domínio de g para o qual $g(x)$ está no domínio de f .

Exemplo: Seja $f(x) = x^2 + 3$ e $g(x) = \sqrt{x}$. Determine:

a) $(f \circ g)(x)$

c) $(g \circ g)(x)$

e) $(g \circ f)(4)$

b) $(g \circ f)(x)$

d) $(f \circ f)(x)$

f) $(f \circ g)(7)$

Propriedades de uma Função

Função injetora: A função $f : A \rightarrow B$ é **injetora** se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem.

$$\forall x_1 \in A, \forall x_2 \in A, \quad x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Propriedades de uma Função

Função sobrejetora: Uma função $f: A \rightarrow B$ é **sobrejetora** se, e somente se, o conjunto imagem for igual ao contradomínio.

$$\forall y \in B, \exists x \in A / (x, y) \in f$$

Função bijetora: Uma função $f: A \rightarrow B$ é **bijetora** quando ela é simultaneamente sobrejetora e injetora.

Propriedades de uma Função

Exemplo: Verifique se as funções são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras:

a) $f: A \rightarrow B$

b) $f: A \rightarrow B$

c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ definida por $f(x) = x^2$

d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x + 2$

e) $f: \{0;1;2;3;4\} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(x) = 2x$

Propriedades de uma Função

Exercício: Determine quais das seguintes funções são injetoras, sobrejetoras e bijetoras.

a) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = x^3$

b) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tal que $f(x) = x^2$

c) $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $h(x) = x^2$.

d) $r : \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\}$ tal que $r(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \text{ for ímpar} \\ 1, & \text{se } x \text{ for par} \end{cases}$

e) $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \geq 0 \\ -1, & \text{se } x < 0 \end{cases}$

Função Inversa

No dia-a-dia, o termo “*inverter*” tem a conotação de virar em sentido contrário. Em Matemática, o termo inverter descreve uma função que desfaz o efeito da outra.

Em um esquema de criptografia, um transmissor deseja que uma mensagem chegue com segurança a seu receptor. A criptografia é a transformação de um domínio de mensagem não cifradas para um domínio de mensagem criptografada aplicando uma **função bijetora**, de modo que se possa calcular sua inversa.

Função Inversa

Definição: Uma função $f : A \rightarrow B$ é inversível quando a relação inversa da f também é uma função. Neste caso, diz-se que a função inversa de f é

$$f^{-1} : B \rightarrow A$$

$$f(x) = y \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x$$

Função Inversa

Exemplo: Verifique quais das funções é inversível.

Não é injetora.
É sobrejetora
Não é inversível

É injetora.
Não é sobrejetora
Não é inversível

É inversível

É injetora
É sobrejetora
 $\therefore$ É bijetora

Função Inversa

Observações:

- f tem inversa se, e somente se, f for uma função bijetora.
- $\text{Dom}(f^{-1}) = \text{Im}(f)$.
- $\text{Im}(f^{-1}) = \text{Dom}(f)$.
- As funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow A$ são inversas uma da outra se, e somente se,
 - $g(f(x)) = x$ para todo x em A
 - $f(g(x)) = x$ para todo x em B .

Função Inversa

Observações:

- Dada $f: A \rightarrow B$, sabemos que $y = f(x)$. Para encontrar, se existir, $f^{-1}: B \rightarrow A$, devemos expressar x em função de y , obtendo assim $x = f^{-1}(y)$.
- Frequentemente utilizamos a mesma variável independente para f e f^{-1} , isto é, $f(x)$ e $f^{-1}(x)$.
- O gráfico de uma função f e o da sua inversa f^{-1} , são simétricos em relação à reta $y = x$.

Exemplo: Determine, se existir, a inversa de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $y = 2x + 1$. Esboce o gráfico de f e f^{-1} no mesmo sistema de coordenadas cartesianas.